




as nossas



bolboretas

2

**algumas bolboretas nocturnas
e outros lepidópteros.**



Macroglossum stellatarum.

Escasa. Vese en terreos soleados e beiras de bosques.



Hyles livornica.

Atópase en espazos abertos con árbores.





Laothoe populi.

Atópase en plantacións, bosques de ribeira ou parques onde medren lamagueiros ou salgueiros.






Thyatira batis. En claros de bosques mixtos, beirais e xardíns




Lasiocampa quercus.

Atópase en bosques e matos nos que medren as plantas das que se alimentan as eirugas.






Lasiocampa (Pachygastria) trifolii.
Vive en baldíos e terreos abertos.





Macrothylacia rubi.

Atópase en ermos, matos e bosques craros.






Phragmatobia fuliginosa. En prados, pasteiros e lindes.

***Diacrisia sannio*.**

Atópase en breixos e
prados de montaña.





Panaxia quadripunctaria. Atópase preto de regueiros.



***Diaphora mendica* ou *Cycnia mendica*.**
Atópase en prados.



Spilarctia lubricipeda.

Atópase en terreos abandonados e un pouco por todas partes.



Mon Daporta



Spilosoma menthastri.

Pódesse atopar en lindes de bosque, matogueiras e terreos baldíos.

Acronicta aceris.
En xardíns e arboredas,
en árbores de folla ancha



***Anhipyra pyramidea*.**
En bosques mixtos e en
froiteiras.



Anaplectoides prasina.
En bosques mixtos e de ribeira.



Xilocampa areola.

As eirugas aliméntanse da pranta
dos chuchameles (***Lonicera***)



Graphiphora augur.

As eirugas aliméntanse en salgueiros
e outras árbores de ribeira.



Amphipyra trogopoginis.

Coñécese co nome de **bolboreta rato** porque adoita desprazarse correndo polo chan en vez de saír voando.

As eirugas aliméntanse de especies variadas de árbores, matos e herbas.





Noctua pronuba. En lindes, parques, matogueiras e zonas pantanosas.




***Heliothis peltigera*.**
Pódese atopar tanto en xardíns
como en campos cultivados e
zonas ruderais,





Autographa gamma.

En campos, xardíns e bosques
caducifolios e de ribeira.





Autographa pulchrina. En xardíns e beiras de bosques.



Bena prasinana. Atópase en carballeiras.



Dysgonia algira. Vese en toxeias e lugares abertos.



Catolaca nupta.

Vive en bosques caducifolios
húmedos.





Avelaíña das couves (*Mamestra brassicae*).
Pódese atopar en cultivos, hortas e xardíns.





Nyctobria muralis. Zonas rochosas secas. A eiruga come liques




Ochropleura pecta.

A eiruga aliméntase nos
salgueiros





Mythima albipuncta. Vive en prados e xardíns.



Mythimna unipuncta. Atópase en lindes, claros e xardíns.



***Polymixis lichenea*.**


Atópase en zonas costeiras. A eiruga alimentase de “*sedum*”, herba de namorar e outras plantas pequenas.





Utetheisa pulchella.

Atópase en herbeiros, leiras abandonadas, e baldíos.





Phalera bucephala. En bosques de ribeira.



Abraxas grossulariata. En bosques e hortas.



Ematurga atomaria. Vese en terreos secos e beiras de bosque.



Hemistola chrysoprasaria. Atópase en claros de bosque, pradeiras e xardíns.

Hemithaea aestivaria.

En campos, xardíns e bosques
claros de caducifolias.





Odezia atrata.

En praderías de montaña.



***Aplocera plagiata*.**
Pradeiras e beiras de
bosques.





***Aspitates gilvaria*.**
En matos e beirais.





Aspitates ochrearia.
Común en terreos incultos.





Scopula incanata. En bosques e pasteiros.



Cabera pusaria.

En bosques de folla caediza.





Calothyrsanis amata.

En parques, xardíns, bosques de caducifolias e praderías





Campthogramma bilineata.

En zonas de media montaña, en prados, claros de bosque, beiras de camiños...

***Eurranthis plummistaria*.**
En matos secos.





Idaea cervantaria. En ermos e terreos secos.



Ectropis crepuscularia.

En bosques, parques e xardíns.





Idaea ochrata.


En beiras de bosque, pradeiras e matos secos.





Isturgia famula. Vive en matos secos.





Lythria sp.

Vive en prados e beiras e claros de bosque,
en zonas secas.

***Lytrosis unitaria*.**

As eirugas aliméntanse de distintas especies de árbores e arbustos de folla ancha.





Petrophora chlorosata. En terreos secos e fenteiras.

***Scotopteryx luridata*.**
As eirugas aliméntanse
de toxos e xestas.





Pseudophantera macularia.
En bosques.

***Xanthorhoe fluctuata*.**

Lindes de bosques, pradeiras,
matos e xardíns.



***Xanthorhoe montanata*.**

Beiras de bosques, matos e xardíns





Bolboreta do inverno
(*Operopthera brumata*).

A eiruga aliméntase en árbores
froiteiras ou de folla caediza.





Trado das froiteiras (*Zeuzera pyrina*). Atópase en plantacións, beiras de bosques e parques



Epichnopterix plumella.
En matos nos que haxa gramíneas.





Pyropteron chrysidiformis.
En terreos baldíos e beirais.





Abella dos lamagueiros
(*Sesia apiformis*).
En lamagueiros e outras
árbores de espazos húmidos.





Huebneriana lonicerae.

En lugares secos, bosques
abertos e pasteiros.





Huebneriana trifolii
ou ***Zygaena trifolii***.
En prados húmidos con flores.





Zygaena nevadensis.

En prados e espazos abertos.



Zygaena filipendulae.

En espazos húmidos
con flores.






Adscita staticeae. En terrenos húmedos de montaña.

Avelaíña do buxo
(*Cydalima perspectalis*). da familia Crambidae. É nativa do leste de Asia. As primeiras citas da súa presenza na Galiza son no 2014. As súas eirugas son unha praga dos buxos.



**Broca das cucurbitáceas
(*Diaphania hyalinata*).**

Da família Crambidae, nativa de América.
As eirugas alimentam-se das plantas das
cabazas, melóns,... e outras espécies de
cucurbitáceas silvestres.






Crambus sp.
Comúns en prados e xardíns



Crambus pasquella

***Chrysocrambus craterella*.**

Moi pequena. En áreas con gramíneas.



***Eudonia angustea*.**

As eirugas aliméntanse
de brións.





Nomophila noctuella.

As eirugas aliméntanse de gramíneas e trevos.





Herpetogramma sp.

As eirugas aliméntanse de herbas.



***Oegoconia deauratella*.**

Moi pequena. As eirugas aliméntanse de restos de materia vexetal.





Cydia pomonella.

Moi pequena. As eirugas poden ser praga en froiteiras.




***Palpita vitrealis*.**

As eirugas alimentam-se dos
gomos das oliveiras.



***Pyrausta acontialis*.**
En matos nos que se
atope cantroxo.



***Synaphe diffidalis*.**
Herbas e matos secos.



***Scythris scopolella*.**

Moi pequena. As eirugas aliméntanse en plantas pequenas e brións das paredes. Os adultos en flores. Activa de día.






Crombrugghia laetus. En beirais e terreos incultos.



Emmelina monodactyla.

En matogueiras e bosques abertos.



***Merrifieldia leucodactyla*.**

En matos secos nos que
medre tomelo e ourego.



Hai moitas máis. Mais estas son as que fumos atopando nas nosas andainas e as que viñeron a visitarnos -as que apareceron arredor ou dentro da nosa casa-.

Adela Leiro e Mon Daporta, xuño 2026