



as n  sas

bolboretas



Eirugas da Paxara
(*Inachis io*)

**Antes de seren fermosas voadoras
Son bechos, eirugas, lagartas,... que rillan raíces, froitos e follas,**



Eirugas da bolboreta da seda (*Bombix mori*)

que mudan de pel, para medrar, varias veces



encasúlanse logo varios días... ou meses;



para saíren logo tal as que coñecedes.



Parella de cuca azul (*Glaucopsyche melanops*)

Despois buscan parella,



Parella de espelliños (*Issoria lathonia*)



Posta de
bolboreta da seda

poñen os ovos e... “desaparecen”.



**Camiñando por Galiza podemos atopar todas as que seguen...
e unhas poucas máis.**

Dentada
(*Carcharodus baeticus*).

Común en prados,
monte baixo e outros
espazos abertos







Saltareira (*Erynnis tages*). Abundante en espazos abertos con vexetación baixa



Dourada (*Ochlodes venata*). Moi abundante en beiras de bosque, prados e terreos ermos.





Pombiña das poligalas (*Pyrgus alveus*).

Escasa. Vese en prados de zonas altas de Lugo e Ourense.

Pombiña das malvas
(*Pyrgus malvae*).

En prados húmidos e
terras de cultivo
abandonadas.





Pombiña das pimpinelas
(*Spialia sartorius*).

Común en lameiros e na beira
dos camiños.



Viuviña do carrasco
(*Strymonidia esculi*).
Común en mato de monte
baixo de zonas secas.



Viuviña da aciñeira
(*Strymonidia ilicis*).

Escasa. Atópase en mato de monte baixo.





Viuviña do escambrón (*Strimonidia spini*). Espallada por medios arbustivos.



Dourada (*Thymelicus lineola*).
Común en áreas de monte
baixo, pradeiras e lugares secos.





Mouriña do sur (*Aricia cramera*).

Escasa. Vese en pradeiras secas con pouca vexetación.



Verdiña dos ollos brancos (*Callophrys rubi*). Común en chans pedregosos e monte baixo.



Cobreada púrpura (*Heodes alciphron*).
Común en flores de lameiros e beiras de ríos.



femia



macho



Mon Daporta

Cobreada escura (*Heodes tityrus*).

Abundante en espacios abiertos húmidos e pradeiras con flores.

femia



macho





Acobreada (*Lycaena phlaeas*).

Común en espazos abertos soleados e beiras de camiños.

Celeste (*Celastrina argiolus*).
Común. Voa en pradeiras e
zonas húmidas con vexetación.





Cuquiña pequena (*Cupido minimus*).
Escasa. So se atopa en pradeiras e
terreos abertos das áreas de
calcárias.





Cuca azul
(*Glaucopsiche melanops*).
Común en lameiros, mato
e camiños.





Azuliña de Idas (*Lycaeides idas*).
Rara. Vese en terreos pobres de
zonas altas.





Meniña da Arxía (*Lysandra bellargus*).
Común, mais só nos solos calcários.



femia



macho

Meniña (*Lysandra coridon*).
So se atopa en zonas
calcárias.



Azuliña de Argos
(*Plebejus argus*).

Común en matos, pradeiras e
beiras de bosque.





Icaro (*Polyommatus icarus*). Moi abundante en espazos abertos e lindeiros de bosques.

Turquesa común
(*Plebicula dorylas*).

So se atopa en espazos
abertos das zonas calcarias.



Tomiñeira de Batón
(*Pseudophylotes baton*).
Común en monte baixo e
pedreiras.





Bolboreta dos xeranios (*Cayreus marshalli*). Presente en Galiza desde finais do século XX. As eirugas parasitan os xeranios ornamentais.



Rabeira (*Lampides boeticus*).

Común e abundante en zonas de vexetación baixa.

femia



macho





Femia, á esquerda, e macho, á dereita.



Rabeira estriada (*Syntarucus* ou *Leptotes pirithous*).
Moi abundante. Vese por todas partes e durante case todo o ano.



Silveira cintada (*Pyronia bathseba*). Escasa. So se atopa no sueste de Galiza en zonas secas, monte baixo e terreos incultos.



Silveira soalleira (*Pyronia cecilia*).

Común. Moi abundante nalgunhas zonas secas da área litoral.



Silveira (*Pyronia tithonus*). Moi abundante en lameiros, camiños e sitios con flores protexidos do vento.



Señora (*Argynnis paphia*).

Abundante en pradeiras floridas, silveiras e á beira de carballeiras.



Dafne (*Brenthis Daphne*).

Escasa. Vese en pradeiras e zonas húmidas das montañas.

Ino (*Brenthys ino*).
Moi rara en Galiza. So se
atopa en pradeiras e áreas
húmidas das serras orientais.





Pandora (*Pandoriana pandora*). Grande, escasa. Vese en espazos abertos con flores da metade sueste de Galiza.



Doncela acastañada
(*Clossiana* ou *Boloria selene*).

Moi común en pradeiras húmidas e fentos
preto de rios e regatos.





Señoriña das brañas
(*Euphydryas aurinia*).
Común en zonas húmidas.





Fabriciana adipe. Moi rara. So se atopa en prados e áreas abertas das zonas altas do sur de Ourense





Señora das montañas
(*Mesoacidalia aglaja*). Común en
claros de bosque e prados nos que
medren violetas.





Espelliños (*Issoria lathonia*). Común en espacios abiertos.




Señoriña punteada (*Melitaea cinxia*).
Escasa. En espazos abertos e solleiros
de zonas medias e altas.





**Señoriña das centáureas
(*Melitaea phoebe*).**

Moi común en zonas floridas de
pradeiras e terreos incultos.






Señoriña da becerra (*Mellicta deione*).
Escasa. Vese en zonas húmidas e
lindeiros de regatos de montaña.



**Señoriña dos prados
(*Mellicta parthenoides*).**

Escasa. Atópase en
lameiros e beiras de
bosques





Apincaráda (*Pararge aegeria*). Das máis comúns e abundantes en zonas frescas.



Estremeira dos valos (*Lasiommata megera*).

Común en zonas pedregosas e lindeiros de bosques e camiños



Estremeira dos penedos
(*Lasiommata maera*).
Común en zonas pedregosas e secas.





Pedresa norteña (*Melanargia galathea*).
Común en espazos abertos da provincia de Lugo.



Pedresa ibérica (*Melanargia lachesis*).
Moi común en pradeiras, lameiros e
zonas de monte baixo.




Pedresa occitana
(*Melanargia occitana*).

So se atopa no sur de
Ourense ao pé da raia con
Portugal





Pedresa das montañas
(*Melanargia russiae*).
Común en espazos abertos
de zonas de montaña.






Erbedeira (*Charaxes jasius*).

Grande, escasa. Vive en áreas de monte baixo onde medren os érbedos.

Sátiro (*Satyrus actaea*).

Rara. Atópase, en espazos abertos de vexetación escasa, nas zonas medias e altas do interior.






Aretusa (*Arethusana arethusa*). Común en pradeiras secas e monte baixo con herba.

Damamoura
(*Brintesia circe*).
Grande, escasa. Vese
em zonas secas e
lindeiros de bosque.



Fauno (*Hipparchia alcyone*).
Común en espazos abertos con
vexetación pobre e preto de
arboredas.





Fauno riscado (*Hipparchia fidia*). Escasa. Atópase en áreas secas con pouca vexetación e abas soleadas.

Fauno
(*Hipparchia semele*).
En espazos abertos, con
rochas, preto de árbores.





Fauno de Zeus
(*Hiparchia statilinus*).

Moi común. Atópase en espazos
abertos de monte baixo.





Pencada (*Aphantopus hyperantus*).

Escasa. Só se atopa en prados e áreas húmidas de zonas medias e altas.



Chinguro dos bosques
(*Limenitis camilla*).

Escasa. Atópase en zonas arboradas preto de ríos e zonas húmidas.





Bailadora dos prados (*Maniola jurtina*).

Unha das máis comúns e abundantes. Prefire áreas con matogueira.



Pardiña das sombras
(*Hyponephele lycaon*).

Rara e localizada en áreas montañosas
con vexetación escasa





Maricela manchada (*Coenonympha arcania*). Común en zonas de media montaña.



Maricela das montañas (*Coenonympha glycerion*). Vese en pradeiras de zonas montañosas.



Maricela velada
(*Coenonympha dorus*).
Voa en montes baixos e
terreos abertos.





Maricela común (*Coenonympha pamphylus*).
Abundante en zonas de monte baixo e claros de bosque.



Montesa pequena (*Erebia epiphron*). Escasa. Vive en pradeiras de montaña



Montesa grande (*Erebia palarica*).
Esacasa. Atópase en pradeiras de altura das
serras orientais.





Montesa común (*Erebia triarius*). Escasa. Voa en pradeiras das serras orientais.




Montesa beireada (*Erebia euryali*).

Escasa. So en prados húmidos e mato das serras máis altas do leste.



Antíopa (*Nymphalis antiopa*).
Escasa. Atópase nas beiras de
lugares arborados



Feiticeira (*Vanessa atalanta*).

Común. Pódese atopar durante case todo o ano en calquera parte.



Feiticeira dos cardos
(*Vanessa cardui* ou *Cynthia cardui*).
Moi común, maiormente en espazos
abertos.





Estrugueira (*Aglaia* ou *Nymphalis urticae*). Común en zonas medias e altas.



Paxara (*Inachis io*).

Abundante en sitios frescos
e húmidos.



Esnacada do ce branco (*Polygonia c-album*). Común en zonas arboradas e silveiras.



Galo cebrado (*Ipheclides podalirius*). Grande. Común en espacios abiertos e outeiros.



Galo do fiuncho (*Papilio machaon*). Grande. Común en outeiros con vexetación.



Carnaval (*Zerynthia rumina*).

Escasa. Vese en outeiros de Ourense, do sur de Lugo e do litoral atlántico.



macho



femia

Aurora (*Anthocharis cardamines*). Común en camiños campos e pradeiras.



Aurora da Provenza (*Anthocharis euphenoides*). Rara. Aparece sobre crucíferas silvestres en camiños, pradeiras e terreos incultos.



Estripeira (*Aporia crataegi*).

Común só en abas soleadas e beiras de bosque do leste e do sur de Ourense.



Xofrada (*Colias croceus*). Chamativa e común en todo tipo de lugares solleiros.



Limoeira (*Gonepteryx rhamni*).
Común en pradeiras e beirais.





Anxiño (*Leptidea sinapis*). Común en pradeiras e beirais.



femia

Anxo das couves (*Pieris brassicae*). Común e abundante en toda Galiza.




Anxo das nabizas (*Pieris napi*). Abundante en pradeiras, lugares húmidos e hortas.



Anxo das nabeiras (*Pieris rapae*). Probablemente a máis abundante de Galiza. Común en hortas e terreos cultivados. A eiruga pode ser unha plaga nos cultivos de verdura.



Noiva da mostarda (*Pontia daplidice*). Común nalgunhas zonas, en áreas abertas.



Cancareira (*Hamearis lucina*).

Moi rara. So se atopa en prados húmidos onde medren os cáncaros (primulas).

A maiores das vistas até aquí, hai outras, das que algunhas voan polo día aínda que as máis prefiren a noite, son as bolboretas das almiñas, as da sorte, as das cartas... As avelaíñas.

Mais esas, das que, polos seus hábitos, se atopan bastantes menos, irán na seguinte.

Adela Leiro e Mon Daporta, xuño 2026