



coleópteros

un cento dos nosos

escaravellos



Os coleópteros (escaravessos) son o grupo de insectos máis numeroso. Caracterízanse polo seu aspecto externo ríxido e resistente, grazas a que o seu par de ás exteriores, os élitros, está endurecido e forma unha especie de estoxo que cubre e protexe as ás membranosas, as que lle permiten voar, e o abdome.

Atópanse en case todos os hábitats, incluídos os das augas doces.

A maioría aliméntase de vexetais e algúns poden ser pragas.



Durante o seu desenvolvemento teñen unha metamorfose completa. Pasan de ovo a larva activa (que sofre varias mudas), e despois por unha fase de pupa (inmóbil) da que saen coa forma adulta.

Secuencia do ciclo de desenvolvemento dun escaravello. A xoaniña



emparellamento




posta




tres fases larvarias



pupa



De aquí en diante imos ver os cen anunciados no título





Dytiscus marginalis.

O adulto mide entre 2,5 e 3,5 cm. A larva, na imaxe, duns 5 cm. É carnívora e cazadora.

Xirinidos.

Poden medir desde os 3 aos 18 mm de lonxitude. Adoitan verse a nadar en círculos na superficie da auga, mais mergullan ao sentírense ameazados. Atópanse en augas de corrente lenta e aliméntanse dos restos e dos pequenos animais que arrastra.





Eurynebria complanata.

Mide entre 1,5 e 2,5 cm. Atópase debaixo de obxectos, nas praias, por enriba da liña da marea. Aliméntase de bechos máis pequenos.



Cychrus caraboides.

Mide entre 1,5 e 2 cm. Atópase principalmente en bosques e outros hábitats sombrizos debaixo de toros podres. Aliméntase de caracois.





Chlaenius velutinus.

Mide entre 13 e 18 mm. Atópase en zonas húmidas. Aliméntase de outros animais pequenos.





Carabus auratus.

Mide entre 2 e 3 cm. Atópase debaixo de pedras e restos vexetais. É carnívoro, cazador activo pola noite.



Nebria brevicollis.

Mide de 1 a 1,5 cm. Activo de noite.
Pasa o día agochado debaixo de
calquera obxecto que llo permita, as
veces en pequenos grupos. Aliméntase
de outros invertebrados.





Agonum viridicupreum.

Mide arredor de 1 cm. Atópase en zonas húmidas.



***Carabus nemoralis*.**
Mide de 2,2 a 2,5 cm.
Alimentase de lesmas.





Calomera litoralis.

Mide entre 1,5 e 2 cm. Atópase nas praias, onde persegue e captura outros insectos.



Cicindela campestris.

Mide alrededor de 1,5 cm. É un cazador activo en terreos secos.



Ocypus olens na posición que adopta cando se sente ameazado.

***Ocypus olens*.**

Mide entre 2 e 3 cm.

Atópase en espazos abertos. Aliméntase de outros invertebrados que caza maiormente de noite.



***Thanatophilus sinuatus*.**
Miden entre 1 e 1,5 cm.
Larvas e adultos
alimentam-se de animais
mortos.



***Ontholestes tessellatus*.**

Mide entre 2 e 2,5 cm.

Larvas e adultos
alimentam-se de restos
animais.



Trox perlatus.

Mide entre 0,8 e 1,3 cm.

Larvas e adultos alimentanse
de restos animais





Trypocopris vernalis.

Mide de 1,5 a 2 cm. Vive en espacios abiertos. Larvas e adultos alimentanse de excrementos de herbívoros.



Trypocopris pyrenaeus.

Mide entre 1 e 2 cm. Larvas e adultos alimentam-se de excrementos de herbívoros.



Geotrupes stercorarius.

Mide uns 2 cm. Adultos e larvas aliméntanse de excrementos de herbívoros.



Anoplotrupes stercorosus.

Mide de 1,2 a 2 cm. Atópase en zonas arboradas. Aliméntase de excrementos.



Coprys lunaris.

Mide entre 1,5 e 2,5 cm. Atópase en
pasteiros na primavera e a comezos
do verán. Aliméntase de excrementos
de herbívoros.

Femia





Scarabaeus laticollis.

Mide entre 1,5 e 2 cm. Atópase en terreos secos. Os adultos e as larvas aliméntanse de excrementos de herbívoros.



Thyphaeus thyphoeus.

Femia. Mide entre 1,5 e 2,5 cm.
Atópase en espazos abertos
nos matos de breixos e
toxeiras. Aliméntase de
excrementos de herbívoros.



Ontophagus nuchicornis.

Mide entre 7 e 10 mm. Larvas e adultos aliméntanse de deposicións de animais herbívoros.





Anoxia australis.

Mide de 2,5 a 3 cm. As larvas alimentáanse das raíces das plantas e tardan catro anos e converterse en adultos.





***Anoxia villosa*.**

Mide entre 1,8 e 2,2 cm. As larvas alimentam-se nas raízes das plantas e tardam tres anos en converterse en adultos.



***Aphodius fimetarius*.**

Mide entre 5 e 8,5 mm. Atópase en prados e pasteiros. As larvas aliméntanse das bostas.





***Lucanus cervus* (vacaloura).**

É o escaravello máis grande de Europa. Os machos poden medir entre 6 e 9 cm, e as femias entre 4 e 6 cm. As larvas aliméntanse, durante varios anos, de madeira morta, maiormente de carballo.



Parella de vacalouras



***Dorcus paralelepipedicus* (vacaloura pequena).**
Mide entre 2 e 3 cm. Atópase en bosques. A larva aliméntase na madeira morta e tarda entre 1 e 2 anos en facerse adulto.



Arriba, un macho, abaixo, unha femia





***Oryctes nasicornis* (escaravello rinoceronte).**
Mide entre 3 e 4,5 cm. As larvas aliméntanse durante varios anos de madeira morta de árbores de folla ancha.





Phyllopertha horticola.

Mide menos de 1 cm. Atópase en sebes, prados e beiras de bosques, onde se alimenta de follas e flores. As larvas comen raíces de herbas e cultivos



Oxythyrea funesta.

Mide entre 8 e 12 mm.

Os adultos aliméntanse nas flores e as larvas nas raíces de plantas diversas.






Tropinota.

Pode medir até 1,5 cm.

As larvas alimentam-se de detritos
e os adultos de pole e gomos.





Trichius fasciatus.

Mide de 1 a 1,5 cm. Atópase en flores de claros de bosque, e preto de regueiros, nas montañas. Os adultos aliméntanse nas flores e as larvas en madeira morta, maiormente en salgueiros.





Pactolinus major.

Mide algo máis de 1 cm. Caza outros insectos.





Anthaxia hungarica.

Mide 15 mm. As larvas perforan polas e toros de carballos e os adultos aliméntanse de pole.



***Hemicrepidius hirtus*.**

Mide entre 13 e 17 mm. As larvas aliméntanse de madeira, e os adultos nas flores.





macho



femia

***Lampyrus noctiluca* (vagalume).** Os machos, alados, miden 1,5 cm, e as femias, sen ás, até 2,5 cm. As larvas aliméntanse durante dous ou tres anos de caracois e de lesmas. Atópanse en prados e sebes.





***Limoniscus violaceus*.**

Mide arredor de 1 cm. Raro. Especie en perigo. As larvas desenvólvense na madeira de diversas árbores.





Cantharis rustica.

Mide entre 1 e 1,5 cm. Larvas e adultos alimentam-se de outros invertebrados.





Rhagonycha fulva.

Mide arredor de 1 cm. Atópase en praderías e claros con “flores” grandes. Aliméntase de pole e de pequenos insectos brandos.





Attagenus trifasciatus.

Mide de 3 a 4 mm. Aliméntanse
de restos animais e ou de
materia vexetal





Exochomus nigromaculatus.

Mide entre 2 e 3 mm. As larvas e os adultos alimentam-se de pulgões.





Psyllabora vigintiduopunctata
(xoaniña)

Mide entre 3 e 5 mm. Aliméntase de fungos das plantas.





Coccinella septempunctata
(Xoaniña, maruxiña...).

Mide entre 7 e 10 mm. As larvas e os adultos aliméntanse de pulgóns.



Xoaniña e larva



***Rodiola* ou *Novius cardinalis*.**

Mide de 2 a 4 mm. É orixinaria de Australia, mais agora xa se atopa en todas as áreas temperadas do planeta. As larvas e os adultos aliméntanse de pulgóns.



Adulto recién saído da pupa



Mordella aculeata.

Mide de 5 a 7 mm. Atópase en espazos abertos floridos. As larvas aliméntanse na madeira podre e os adultos nas flores.





***Meloe proscarabeus* (aceiteira).**

As femias, na imaxe, miden uns 3 cm, o dobre que os machos, porque teñen o abdome máis desenvolvido. As larvas parasitan as reservas das abellas e os adultos aliméntanse de vexetais.





***Berberomeloe majalis* (aceiteira).**

As femias (na imaxe) poden medir até 7 cm, os machos menos da metade. As larvas aliméntanse das larvas e do pole que xuntan as abellas solitarias, e os adultos aliméntanse de vexetais.




Oedemera flavipes.

Mide arredor de 1cm.

Os adultos aliméntanse de pole e as larvas nos talos de varias plantas ou de restos vexetais.





femia

Oedemera nobilis.

Mide arredor de 1 cm. Atópase en espazos con flores, onde se alimentan os adultos. As larvas viven nos talos de diversas plantas.



macho



Mylabris quadripunctata.

Mide entre 1,3 e 1,5 cm. Atópase en espazos solleiros con flores. Os adultos aliméntanse de pole e as larvas, que se desenvolven no chan, de ovos e larvas de insectos.





Heliotaurus ruficollis.


Mide entre 1 e 2 cm. As larvas alimentam-se de restos e os adultos nas flores.



Cteniopus sulphureus.

Mide de 7 a 8 mm. Aliméntase nas flores.





Lagria hirta.

Mide entre 7 e 10 mm. Atópase en herbeiros. As larvas aliméntanse de residuos vexetais, e os adultos vexetais.





***Alphasida* ou *Glabrasida leonensis*.**
Mide de 1,5 a 2 cm. É endémica dos montes do sueste de Galiza e arredores.





***Blaps lusitanica* (cascudo).**

Mide entre 3 e 3,5 cm, pero tamén pode pasar dos 4 cm. Atópase en espazos húmidos e escuros. Aliméntase de restos. Ten hábitos nocturnos. Cando se sente atacado desprende un líquido fedorento.



Erodus gorgyi.

Mide 1,2 cm. Atópase nos areais. Aliméntase de materia orgánica. As larvas viven enterradas na area e son cazadoras.



***Opatrum sabulosum*.**

Mide arredor de 1 cm. As larvas aliméntanse das partes subterráneas das plantas e os adultos das partes aéreas.



Enicopus hirtus.

Mide arredor de 1 cm. Atópase en inflorescencias de gramíneas, onde se alimenta de larvas e insectos máis pequenos.





Malachius bipustulatus.

Pode medir entre 7 e 10 mm.
Alimentam-se de animais
pequenos, as larvas no chan ou
nas tonas das árvores e os
adultos nas flores.





Psilothrix viridicoerulea.


Mide até 1 cm. Aliméntase de pole e de outros invertebrados pequenos.



Trichodes octopunctatus.

Mide 1,5 cm. Aliméntase nas flores de pequenos insectos e larvas.

As larvas medran en nidos de abellas solitarias.






Pyrochroa coccinea.

Mide uns 2 cm. As larvas aliméntanse de madeira en descomposición e dos fungos que medran nela. Os adultos aliméntanse nas flores.






Aromia moschata.

Pode medir de 1,5 a 3,5 cm.

Vese durante a primavera e o verán.

As larvas aliméntanse, durante anos, da madeira dos salgueiros.






***Stangalia* ou *Rutpela maculata*.** Mide entre 1,3 e 2 cm. Vese na primavera e no verán enriba das flores.





Stenurella melanura.

Mide arredor de 1 cm. Vese na primavera e no verán enriba das flores. As larvas aliméntanse en carballos, piñeiros,...






Phoracantha semipunctata
(trado dos eucaliptos). Pode medir
de 1,5 a 3 cm. As larvas aliméntanse
de madeira de eucalipto.






***Paracorymbia stragulata* ou *Leptura stragulata*.**

Mide entre 1 e 1,5 cm. Vese nas flores . As larvas vivem na madeira em decomposição dos piñeiros.



***Pseudovadonia* ou *Leptura livida*.**

Mide arredor de 1 cm. As larvas aliméntanse de restos no chan durante dous anos. Os adultos comen nas flores





***Iberodorcadion seoanei*.**

Mide uns 2 cm. Atópase camiñando polo chan nas alturas das serras do leste e do sur de Ourense.



***Chlorophorus trifasciatus*.**

Mide arredor de 1 cm. Os adultos vense nas flores. As larvas aliméntanse nas raíces de plantas leguminosas.





Cerambix cerdo.

Mide entre 3 e 6 cm. Ten actividade nocturna. As larvas aliméntanse, durante tres ou catro anos, da madeira dos carballos.



Agapanthia cardui.

Mide entre 0,8 e 1,4 cm.

Os adultos alimentam-se nas flores e as larvas dentro dos talos de varias plantas.





Clytus arietis.

Mide entre 1 e 2 cm. As larvas viven en madeira podre. Pode verse nas flores desde finais da primavera a principios do verán.



Spondylus buprestoides.

Mide de 1,5 a 2,5 cm. As larvas desenvolvem-se na madeira dos pinheiros durante quase dois anos.





Agelastica alni (escarabello das amieiras).

Mide entre 6 e 8 mm. Adultos e larvas aliméntanse das follas das amieiras.



Chrysolina grossa.

Mide arredor de 1 cm. Aliméntase de plantas da familia das mentas.

Crhysolina lucida.

Mide entre 6 e 8 mm.

Aliméntase de plantas da
familia das mentas.



Chrysolina mactata.

Mide menos de 1 cm.
Tanto as larvas como os
adultos alimentanse de
linarias. É endémica do
noroeste da península
ibérica.





Chrysolina menthastri.


Mide de 7 a 11 mm. Larvas e adultos alimentanse de menta, mentraste e estrugas.

Chrysomela populi.

Mide de 9 a 13 mm.


Aliméntase de follas de
árbores, maiormente
lamagueiros e salgueiros.





Chrysolina americana.

Mide arredor de 1 cm. Larvas e adultos aliméntanse de romeu, lavanda e cantroxo.





***Dlochrysa* ou *Fasta fastuosa*.**

Mide entre 6 e 8 mm. Larvas e adultos aliméntanse de lamios e estrugas





Leptinotarsa decemlineata
(escaravello da pataca). Mide arredor de 1 cm. Adultos e larvas aliméntanse das follas da pataca, da que poden ser praga.



Chrysolina bankii.

Mide uns 8 mm.

Aliméntase de plantas da
familia das mentas.






Plagiodera versicolora.

Mide de 4 a 5 mm. Larvas e adultos aliméntanse de follas de salgueiros.




Exosoma lusitanica.

Mide arredor de 1 cm. Atópase en matos e claros de bosque en zonas secas.




Lachnaia pubescens.
Mide alrededor de 1 cm.
Aliméntase en diversas
plantas.



***Tituboea biguttata*.**

Mide arredor de 1 cm. As larvas críanse nos formigueiros e os adultos aliméntanse en diversas plantas.



***Oedionychis cincta*.**

O macho mide uns 5 mm, a femia chega aos 9 mm.

Tanto larvas como adultos aliméntanse de plantas, habitualmente chantaxes e seoane.





Altica lythri.

Mide entre 4 e 5 mm. Adultos e larvas aliméntanse das follas das vides.



Clytra quadripunctata.

Mide entre 7 e 10 mm. As larvas vivem nos formigueiros e os adultos alimentam-se nas flores.




***Coptocephala scopolina*.**

Mide entre 5 e 7 mm. As larvas aliméntanse no chan e os adultos atópanse nas flores en lugares soleados,



***Cryptocephalus aureolus*.**

Mide entre 6 e 8 mm. Atópase en
árbores e arbustos de folla ancha.






Cryptocephalus vitatus.

Mide de 3 a 5 mm. Aliméntanse
en plantas diversas.



Bruchus rufimanus.

Mide de 3 a 4 mm. As larvas alimentam-se de sementes de legumes, os adultos visitam as flores.





Timarcha tenebricosa.

Pode medir entre 1 e 1,5 cm.
Atópase en praias e dunas.
É endémica do noroeste da
península ibérica.



Anisorhynchus scabrosus.


É um dos gurgullos máis grandes. Mide arredor de 1,5 cm. Atópase en terreos calcarios secos.





***Gonipterus scutellatus* (gurgullo do eucalipto).**
Mide de 7 a 9 mm. É orixinario de Australia. Está presente en Galiza desde 1991. Larvas e adultos aliméntanse das follas e gromos do eucalipto.

larva



***Polydus hispanus*.**

Mide entre 9 e 11 mm.
Atópase en pastos secos
e xesteiras.



Larinus turbinatus
(gurgullo dos cardos).
Mide entre 8 e 10 mm. As
larvas e os adultos
atópanse nas flores dos
cardos.





Mononychus punctualbum.

Mide arredor de 6 mm. Atópase en zonas húmidas. As larvas e os adultos aliméntanse no *Iris pseudoacorus*.





***Attactagenus albinus*.**

Mide arredor de 5 mm. As lavas aliméntanse de raíces e os adultos de follas de diversas plantas.



***Sphenophorus piceus*.**

Mide entre 11 e 15 mm.

As larvas alimentam-se nas
canas (*Arundo donax*)



Rhynchophorus ferrugineus
(picudo vermello ou
escaravello das palmeiras).

Pode medir entre 2 e 5 cm.
É orixinario de Asia tropical. As
larvas son una praga das
palmeiras. Chegou a Galiza no
2012 e desde aquela arrasou a
maior parte das palmeiras .





Montaxe Mon Daporta
Imaxes: Mon Daporta e Adela Leiro
Xuño 2026