







**os meus, n^{os},
paxariños**




Este traballo recolle os paxaros galegos máis comúns, e as versións en “bechos bola” que fixen deles para outras cousas.




Cotovía (*Galerida cristata*).
Mide de 17 a 19 cm. Atópase en
campos abertos, ermos e cultivos.





Laverca (*Alauda arvensis*).
Mide de 16 a 18 cm. Atópase
en cultivos e baldíos.





Anduriña (*Hirundo rustica*).

Mide de 17 a 21 cm. Atópase preto das casas no medio rural. So nos visita durante a primavera e o verán.




Niño de anduriña con polos a piques de voar.





Anduriña do cu branco (*Delichon urbica*).
Mide de 13 a 15 cm. Atópase maiormente
no medio urbano. So nos visita da primavera
ao verán






Anduriña daurica (*Hirundo daurica*).

Mide de 14 a 19 cm. Vese en penedías, grandes edificios, pontes e campos abertos do sueste de Galiza.




Niños de anduriña daurica debaixo dun viaducto dunha estrada na provincia de Ourense



Anduriña dos penedos
(*Ptyonoprogne rupestris*).
Mide de 14 a 15 cm. Vese en
paredes rochosas e
construcións.




Anduriñas dos penedos na parede da presa dun encoro




Pica dos prados (*Anthus pratensis*).
Mide de 14 a 15 cm. Atópase en
prados e espazos abertos.





Pica das árbores (*Anthus trivialis*).
Mide de 14 a 16 cm. Atópase en
campos con árbores e beiras de
bosques. So está con nós na
primavera e no verán.






Lavandeira verdeal

(*Motacilla flava iberiae*).

Mide de 15 a 16 cm. Atópase preto de masas de auga. Somentes está con nós na primavera e no verán.







Lavandeira branca

(*Motacilla alba alba*).


Mide de 16 a 19 cm. Atópase preto de lugares habitados en campos e beiras de camiños.






Lavandeira real (*Motacilla cinerea*).
Mide de 17 a 20 cm. Atópase nas
beiras dos ríos con corrente.






Merlo rieiro (*Cinclus cinclus*).
Mide de 17 a 20 cm. Atópase nos
cursos medios e altos dos ríos.





Borrallenta, azulenta
(*Prunella modularis*).
Mide de 13 a 14 cm. Atópase
en matos.






Carriza

(*Troglodytes troglodytes*).

Mide de 9 a 10 cm. Atopase en espazos con vexetación baixa mesta.






Merlo (*Turdus merula*).
Mide de 23 a 29 cm. Atópase en
campos, hortas, xardíns e matos
de vexetación mesta.




Femia recollendo materiais
para facer o niño.




Tordo común (*Turdus philomelos*).
Mide de 20 a 22 cm. Atópase en
arboredas, parques e ribeiras
fluviais.





Tordo charlo (*Turdus viscivorus*).
Mide de 26 a 29 cm. Atópase en
bosques abertos.






Papuxa das amorias

(*Sylvia atricapilla*).

Mide de 13 a 15 cm. Atópase en silveiras e mato en beirais, bosques, áreas de cultivo e zonas habitadas.



Arriba macho e á esquerda femia.




Papuxa de cabeça negra

(*Sylvia melanocephala*).


Mide de 13 a 14 cm. Atópase en matos mestos de zonas solleiras.






Papuxa montesa (*Sylvia undata*).
Mide de 13 a 14 cm. Atópase en matos
de monte baixo.





Fulepa amarela (*Hippolais polyglotta*).
Mide de 12 a 13 cm. Atópase en matos,
beirais e ribeiras de zonas húmidas. So
nos visita no verán.






Picafolhas ibérico

(*Phylloscopus ibericus*).

Mide de 11 a 12 cm. Atópase en bosques e matos preto de ribeiras fluviais. So nos visita no verán.






Picafolhas europeo

(*Phylloscopus collybita*).

Mide de 11 a 12 cm.

Atópase en árbores de campos, ribeiras fluviais e parques. So está con nós no inverno.






Reiseñor (*Luscinia megarhynchos*).
Mide de 15 a 16 cm. Atópase en fragas e
arboredos con mato, ribeiras fluviais e sebes.



Xuvenil de reiseñor antes de adquirir a prumaxe de adulto




Rabirrubio (*Phoenicurus ochruros*).
Mide de 13 a 14 cm. Atópase en rochedos, construcións, cantís e canteiras.




Arriba: á esquerda un macho e á dereita unha femia.
Abaixo: un xuvenil que acaba de deixar o niño.





Pedreiro cincento (*Oenanthe oenanthe*).
Mide de 14 a 16 cm. Atópase en campos
e ermos. So nos visita no verán.





Paporrubio (*Erithacus rubecula*).
Mide de 12 a 14 cm. Atópase en
bosques, cultivos, parques e
xardíns.






Chasco (*Saxicola rubicola* antes *Saxicola torquata*).
Mide de 11 a 13 cm. Atópase en
cultivos, beirais e matos.

femia






Papamoscas negro (*Ficedula hypoleuca*).
Mide 12 a 13 cm. So se ve nos pasos,
maiormente ao remate do verán, en lugares
arborados.



As femias, na imaxe, adoitan ter a cabeza e o lombo de cor parda



Picaxuncos (*Cisticola juncidis*).
Mide de 10 a 11 cm. Atópase en
xunqueiras e prados preto de zonas
húmidas.






Estreliña riscada

(*Regulus ignicapilla*).

Mide de 9 a 10 cm. Atópase
en zonas arboradas –
bosques, parques e xardíns-.





Ferreiriño subeliño

(*Aegithalos caudatus*).


Mide de 13 a 15 cm. Atópase
en bosques e ribeiras fluviais.






Ferreiro abelleiro (*Parus major*).
Mide de 13 a 15 cm. Atópase en
arboredos, hortas e ribeiras
fluviais.






Ferreiriño bacachis (*Parus caeruleus*).
Mide de 10 a 12 cm. Atópase en
arboredos, parques, hortas e ribeiras
fluviais.





Ferreiriño común (*Parus ater*).
Mide de 10 a 11 cm. Atópase
en bosques, parques e áreas
cultivadas con árbores.






Gabeador común

(*Certhia brachydactyla*).

Mide de 12 a 13 cm. Atópase
en zonas arboradas







Picanzo real meridional


(*Lanius meridionalis*).


Mide de 22 a 26 cm. Atópase en monte baixo, matos e bosques abertos.







Pega (*Pica pica*).
Mide de 40 a 50 cm. Atópase en
terras de cultivo, arboredos e
parques.





Gaio, pega real (*Garrulus glandarius*).
Mide de 32 a 35 cm. Vive en bosques e
arboredas.






Corvo viaraz ou corvo pequeno
(*Corvus corone*).


Mide de 44 a 51 cm. Atópase en
espazos abertos e zonas
cultivadas con árbores.






Corvo carnazal (*Corvus corax*).
Mide de 54 a 67 cm. Atópase en
penedías costeiras e de montaña.





Gralla cereixeira (*Corvus monedula*).
Mide de 30 a 34 cm. Aliméntase nos
campos e acóllese en penedías e
edifícios.






Choia de bico vermello

(*Pyrrhocorax pyrrhocorax*).


Mide de 37 a 41 cm. Atópase en penedías da beiramar e do interior.





Estornio negro
(*Sturnus unicolor*).
Mide de 19 a 22 cm.
Atópase en cultivos,
parques e xardíns.



Tres estornios vivían un furado
dunha árbore onde queren aniñar





Estorninho pinto (*Sturnus vulgaris*).
Mide de 19 a 22 cm. Atópase en
cultivos, parques e xardíns.







Pardal (*Passer domesticus*).

Mide de 14 a 16 cm. Atópase sempre preto de asentamentos humanos.

Unha parella de pardais, a femia á esquerda e o macho á dereita, ao pé do furado da parede no que queren aniñar





Pimpín (*Fringilla coelebs*).
Mide de 14 a 16 cm. Atópase
en hortas, cultivos, arboredos
e xardíns.

Parella de pimpíns,
diante a femia






Xirín (*Serinus serinus*).

Mide de 11 a 12 cm. Atópase en cultivos, parques e xardíns.



Arriba un macho e,
á esquerda, unha femia




Verderol (*Chloris chloris* antes *Carduelis chloris*).
Mide de 14 a 16 cm. Atópase en zonas de cultivo
con árbores e sebes.



Parella de verderois. Á esquerda a femia e á dereita o macho






Úbalo, pincaouro (*Spinus spinus*
antes *Carduelis spinus*).

Mide de 11 a 12 cm. Vese en
arboredas á beira de cursos
fluviais. So nos visita no inverno.



Parella de úbalos. Á esquerda a femia e á dereita o macho



Pardillo

(*Linaria cannabina* antes *Carduelis cannabina*).

Mide de 12 a 14 cm. Atópase en campos e ermos con mato.




Parella de pardillos, á esquerda o macho e á dereita a femia.




Xílgaro (*Carduelis carduelis*).
Mide de 12 a 13 cm. Vese en
cultivos e ermos preto de árbores.





Paporrubio real (*Pyrrhula pyrrhula*).
Mide de 15 a 17 cm. Atópase en
arboredos e lugares sombrizos preto
da auga.







Escribenta liñaceira

(*Emberiza cirlus*).

Mide de 15 a 16 cm. Atópase en beirais, cultivos e beiras de bosques abertos.




Arriba un macho e, á esquerda, unha femia apañando materiais para facer o niño.



Escribenta riscada (*Emberiza cia*).
Mide de 15 a 16 cm. Atópase en
terreos ermos abertos en abas
degradadas.






Bico de coral (*Estrilda astrild*).
Mide de 11 a 12 cm. Atópase en
áreas cultivadas, xunqueiras e
matos de zonas húmidas. Entrou
en Galiza, desde Portugal, no ano
1994.



E outros menos comúns, ou dos que non
fun quen de facer unha foto ao xeito


Tordo malvís (*Turdus iliacus*).
Mide de 19 a 23 cm. Vese en
espazos abertos. So nos visita
no inverno, e chega a ser
abundante nos invernos fríos.





Papuxa común (*Sylvia communis*).
Mide de 13 a 15 cm. Vese en espazos
abertos con mato. So nos visita na
primavera e no verán, e un número
escaso.






Escribenta nival

(Plectrophenax nivalis).

Mide de 15 a 18 cm. Na Galiza atópase, so no inverno e escaso, en zonas costeiras: dunas, praias e ermos á súa beira.






Cotovia pequena (*Lullula arborea*).

Mide de 13 a 15 cm. Atópase, escasa, en espazos abertos e cultivos con árbores espalladas.




Reiseñor da auga (*Cettia cetti*).
Mide de 13 a 14 cm. Atópase en
matogueiras de sitios húmidos: beiras de
ríos, regatos, lagoas,... É escaso




Ouriolo (*Oriolus oriolus*).


Mide de 22 a 25 cm. Atópase en bosques. So está con nós no verán, e non é común



Ferreiriño cristado (*Parus cristatus*).
Mide de 10 a 12 cm. Atópase en
piñeirais.




Piquelo (*Sitta europaea*).
Mide de 12 a 14 cm. Atópase
en bosques de folla caediza e
parques.




Picanzo vermello (*Lanius collurio*).

Mide de 16 a 18 cm. Atópase en matos mestos. So nos visita no verán, e non é común.



Pardal orelleiro (*Passer montanus*).
Mide de 12 a 14 cm. Atópase en
cultivos preto das casas, en espazos
rurais.






Pardal chiador (*Petronia petronia*).

Mide de 15 a 17 cm. Atópase en espazos abertos e edificacións abandonadas ou en ruínas. É moi escaso.

Escribenta das canaveiras (*Emberiza schoeniclus*).

Mide de 13 a 15 cm. Vese, case so no inverno, en áreas húmidas ou nas súas proximidades. Pouco común.


A subespecie presente na Galiza atópase en perigo de extinción.







ABECE de aves galegas

Taboleiro do xogo dos paxariños



59 paxaros





Mon Daporta Padín
Agosto 2026